

Rajattu lääkkeenmäärääminen

1. Vastaajan taustaorganisaatio

Vastaajien määrä: 1

- 1 Suomen yleislääkärit GPF ry

2. Arvioi ehdotusta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
Kunnan tai kuntayhtymän järjestämismvastuulle kuuluvissa terveydenhuollon avohoidon palveluissa työskentelevällä sairaanhoitajalla, jolla on riittävä käytännön kokemus ja joka on suorittanut valtioneuvoston asetuksella säädettyään lisäkoulutuksen, on rajattu oikeus määrätä apteekista hoidossa käytettäviä lääkkeitä hoitamalleen potilaalle.	1	0	0	0	0	1	1
Oikeus koskee myös sopimuksen perusteella hankittavia terveydenhuollon avohoidon palveluja.	0	1	0	0	0	1	2
Yhteensä	1	1	0	0	0	2	1,5

3. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- 1 Muuttuvissa perusterveydenhuollon toimintamalleissa on järkevää, että lakimuutosehdotuksessa terveyskeskus korvataan avohoidon palvelujen käsitteellä. Tämä kattaa selkeämmin myös esimerkiksi kotiin vietävät palvelut. Tältä osin ehdotus on tarkoituksenmukainen.

Kun kyse on julkisesti järjestetystä palvelusta, on tuottajien – oli kyseessä sitten julkinen palvelutuotanto tai yksityiseltä hankittu palvelu – syytä toimia samojen lääketieteellisten ja hoidollisten periaatteiden mukaisesti. Sama pätee myös tilanteeseen, jossa potilas mahdollisen valinnanvapauden kautta hakeutuu itsenäisesti palveluntuottajalle. Potilaalla on oikeus olettaa, että palveluntuottajat toimivat yhtenäisin toimintatavoin. Ehdotus on sikäli melko tarkoituksenmukainen, mutta kaipaa täsmennyksiä.

4. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta?

Vastaajien määrä: 1

- 1 Yksityiskohtaiset säädöskohtaiset kommentit:

Pykälän ensimmäisessä momentissa mainittu ennalta ehkäisevän hoidon käsite voi olla tulkinnanvarainen, ja voi tahattomasti laajentaa laissa haettua rajausta. Voimassa olevassa säädöksessä on tuotu myös vahvempana esiin lääkärin tekemän taudinmäärityksen merkitys, joka on olennaisen tärkeää.

On tärkeää, että rajattu lääkkeenmääräämisoikeus edellyttää toimintayksikön vastaavan lääkärin kirjallista määräystä. Toiminnan turvallisuuden kannalta on huolehdittava, että kyse ei ole oikeudesta, jonka ammattihenkilö automaattisesti saa määrittelyn koulutuksen suoritettuaan, vaan että asianmukainen kontrolli ja ohjanta säilyvät. Muuten vastaava lääkäri ei kykene ottamaan toiminnasta tosiasiallista vastuuta.

Yleiset kommentit:

Lähtökohtaisesti Suomen yleislääkärit ry ei pidä ns. hoitajareseptiä tarpeellisenä, jäljessä eriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Haluamme tuoda esiin seuraavat asiat:

- Hoitajaresepti ei ratkaise terveydenhuollon resurssiongelmaa. Oleellista on lisätä riittävästi ja mahdollisimman pian perusterveydenhuollon lääkärin määrää. Tämä

mahdollistaisi myös todelliset kustannussäästöt vähentämällä kalliita päivystyksen ja erikoissairaanhoidon kuluja.

- Reseptin kirjoitus ei ole mekaaninen toimenpide vaan kokonaisarvio potilaan hoidosta.
- Lääkityksen määräämiseen kuuluu olennaisena osana hoitovastuun ottaminen. Kenellä hoitovastuu on: lääkkeen mekaanisesti uusineella hoitajalla vai alkuperäisen diagnoosin tehneellä lääkärillä vai terveydenhuollon yksikön vastuulääkärillä?
- Entä niissä tilanteissa, joissa diagnoosi on jo vuosia sitten tehty?
- Lääkärillä on oltava oikeus ja mahdollisuus, yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti, kirjata reseptiin "ei hoitajan uusittavissa"; vastaavalla tavalla kuin "ei lääkevaihtoa"
- Reseptin voimassaoloajan pidentäminen kahteen vuoteen mahdollistaa käytännössä sen, että hoitava lääkäri on oikeasti tavoitettavissa.
- Hoitajareseptille mahdollisesti siirrettävien hoidettavien tautien tulee olla yksiselitteisiä ja selkeitä. Hoidon arvion sekä itse hoidon tulee olla toteutettavissa strukturoiduilla ja selkeillä ohjeilla. Tästä esimerkkinä on Käypä hoito –suosituksen mukainen virtsarakkotulehduksen hoito sekä ikärajoituksin tavanomaiset ehkäisyvalmisteet.
- Antihistamiinilääkkeet voisi siirtää käsikaupapuolelle myös suurempien pakkaukokojojen osalta.
- Kansansairauksien osalta on pidettävä asianmukaisena sitä, että potilaalla on perustavaa tasoa oleva oikeus päästä vähintään kahden vuoden välein terveydentilaansa koskevaan lääkärin arvioon. Suurin osa näistä potilaista sairastaa myös muita vakavia sairauksia, jolloin kokonaisarvion tarve korostuu entisestään.
- Korostetaan, että yksikön vastaavalla lääkärillä on oltava tosiasiallinen mahdollisuus määrätä yksikkönsä sairaanhoitajaa lääkkeenmääräämisoikeutta koskevissa asioissa ja tehdä niissä tarvittaessa myös asiaan kuuluvia rajoituksia.
- On tehtävä selväksi, mikä on kyseessä olevassa asiassa toimintayksikön ylilääkärin käsite. Mikä on julkisen tahon järjestämän, mutta yksityisen palveluntuottajan asemointi? Entä vapaan valinnan kautta puhtaammin yksityisen palveluntuottajan tilanne?
- Digitaaliset palvelut toimivat hyvänä apuna lääkehoidon arvioissa, mutta eivät korvaa lääkärin lopullista yksilöllistä ja inhimillistä arviota.
- Rokotteet voidaan siirtää hoitajan reseptille. Kyse ei ole diagnostiikasta ja asiasta on hyvät ja ajankohtaiset ohjeistukset saatavilla. Perusterveydenhuollossa tämä rooliutus on jo nykyisellään toimivaa.
- Ja vielä: Terveydenhuollon henkilöstön koulutus, myös lääkkeisiin liittyvissä asioissa, on ehdottoman tärkeää ja hyödyttää koko yhteisöä ja potilasta.

5. Arvioi ehdotusta asetuksen 5 §:n ja 10 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
5 § Rajattu lääkkeen määrääminen Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö määräävät lääkettä vaikuttavan aineen, vahvuuden ja lääkkeemuodon perusteella taikka lääkevalmisteen kaupanimellä myyntiluvallisena pakkauksena liitteessä 1 lueteltuihin tautitiloihin.	1	0	0	0	0	1	1
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa määrätä erityislupavalmisteita.	1	0	0	0	0	1	1
10 § Lääkkeen määrääminen Sen estämättä, mitä 4 momentissa säädetään, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kättilö saa määrätä lääkettä naisen äkillisen komplisoitumattoman virtsatietulehduksen hoitoon puhelinhaastattelun perusteella.	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	3	0	0	0	0	3	1

6. Voitte halutessanne perustella vastauksenne:

Vastaajien määrä: 1

- Ei ole erityistä perustetta sille, etteikö lääkemääräystä voisi tehdä lääkkeen kaupanimellä geneerisen nimen sijaan.

Erityislupavalmisteiden luonteen mukaisesti niiden määräämisessä on noudatettava erityistä harkintaa. Kyseessä on tyypillisesti laajaa lääketieteellistä harkintaa vaativa tilanne, joka ei sovi rajatun koulutuksen saaneen ammattihenkilön arvioitavaksi. Nämä tilanteet ovat myös siinä määrin harvinaisia, ettei nykykäytännön muuttamisella saataisi esimerkiksi merkittäviä resurssisäästöjä.

Jos ja kun asianmukainen strukturoitu haastattelu suoritetaan, ei Käypä hoito –suosituksen mukaisessa virtsarakkotulehduksen hoidossa tulisi olla ongelmaa. Samalla on kiinnitettävä huomiota siihen, että prosessi tehdään oikein ja vaikkapa potilaat, joilla on toistuvia virtsatietulehduksia, ohjataan viiveettä lääkärin arvioon.

7. Arvioi ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 antibiootteja. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
J01FA10, atsitromysiini; klamydia	0	0	0	1	0	1	4
J01XE01, nitrofurantoiini; äkillinen, komplisoitumaton							

alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	2	0	2	4

8. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- ┆ Lähtökohtaisesti lääkityksen aloittaminen edellyttää diagnoosin tekoa, joka on nykysäädöstenkin mukaisesti lääkärin tehtävä.

9. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
J01DB01, kefaleksiini; nieluvilje-lyllä tai StrA-pikatestillä varmen-netun nielutulehduksen hoito, kun potilaalla on penisilliiniallergia, rintatulehdus imettävällä	0	0	0	1	0	1	4
S01AA01, kloramfenikoli; märkäinen silmän sidekalvon tulehdus, näärännäppy/luomirakkula	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	2	0	2	4

10. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- ┆ Edellä mainitut tautitilat vaativat lääkärin arviota, taudinmäärittystä ja dokumentointia.

11. Arvioikaa ehdotusta tarkentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
J01CA08, pivmesillinaami; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	1	0	0	0	0	1	1
J01EA01, trimetopriimi; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	2	0	0	0	0	2	1

12. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- ┆ Ikärajat ovat järkevät erotusdiagnooseja ajatellen. Virtsarakkotulehduksen osalta on olemassa hyvät ohjeistukset, joita noudattaen koulutuksen saanut hoitaja kykenee potilaan hoitamaan.

13. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan allergiseen nuhaan. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R06AE07, setiritsiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AE09, levosetiritsiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX13, loratadiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX18, akrivastiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX22, ebastiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX26, feksofenadiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX27, desloratadiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX29, bilastiini	0	0	0	1	0	1	4
R01AC01, dinatriumkromoglikaatti	0	0	0	1	0	1	4
R01AC02, levokabastiini	0	0	0	1	0	1	4
R01AC03, atselastiini	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	11	0	11	4

14. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Näiden lääkkeiden osalta on syytä harkita niiden vapauttamista käsikauppaan. Hoitajareseptiokeudelle ei siten ole tarvetta.

15. Arvioikaa ehdotusta lisätä rokote asetuksen liitteeseen 1 ja poistaa siitä rokote.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
Lisätään: J07BA01, inaktivoitu puutiaisaiivotulehdusrokote	1	0	0	0	0	1	1
Poistetaan: J07BK, vesirokkorokote	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	2	0	0	0	0	2	1

16. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Esitys on tältä osin hyvin perusteltu. Rokotteet voidaan siirtää hoitajan reseptille. Kyse ei ole diagnostiikasta ja asiasta on hyvät ja ajankohtaiset ohjeistukset saatavilla. Perusterveydenhuollossa tämä roolitus on jo nykyisellään toimivaa.

17. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
G03A, systeemisesti käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, 15-34-vuotiaalle naiselle; ATC-luokkaan G03AD kuuluvia valmisteita sairaanhoitaja voi määrätä myös 35-vuotiaille ja sitä vanhemmille	1	0	0	0	0	1	1
G02BA03, progesteronia sisältävä muovikierukka; 15-34-vuotiaalle naiselle	1	0	0	0	0	1	1

G02BB01, progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät emätinrenkaat; 15-34-vuotiaalle	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	3	0	0	0	0	3	1

18. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Ikärajoitukset ovat perustellut.

19. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
C08CA, dihydropyridiini johdokset; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C09B ACE-estäjät, yhdistelmävalmisteet; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C09CA, angiotensiini II-reseptorin salpaajat; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C09DA, angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja diureetit; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C09DB, angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat; primaarinen verenpainetauti	0	0	0	1	0	1	4
C01DA02, glyseryyliitrintraatti; angina pectoris -rintakipu	0	0	0	1	0	1	4
C01DA08, isosorbididinitraatti; angina pectoris -rintakipu	0	0	0	1	0	1	4
C01DA14, isosorbidimononitraatti; angina pectoris -rintakipu	0	0	0	1	0	1	4
B01AC06, asetyylisalisyylihappo; antitrombootinen hoito	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	9	0	9	4

20. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Kun lääkemääräyksen voimassaoloaika on pidennetty kahteen vuoteen, voidaan kysyä, onko hoitajan lääkemääräysoikeudella (uusimisoikeus) näissä sairauksissa merkitystä? Olisiko pikemminkin varmistettava se, että sydän- ja verisuonitauteja sairastavalla potilaalla olisi mahdollisuus päästä hoitavan lääkärin arvioon vähintään kahden vuoden välein?

21. Arvioikaa ehdotusta täsmentää asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyvien beetasalpaajien ATC-luokkaa C07. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

--	--	--	--	--	--	--	--

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
C07AA, epäselektiiviset beetasalpaajat	0	0	0	1	0	1	4
C07AB, selektiiviset beetasalpaajat	0	0	0	1	0	1	4
C07AG, alfa- ja beetareseptoreita salpaavat lääkeaineet	0	0	0	1	0	1	4
C07B, beetasalpaajat ja tiatsidit	0	0	0	1	0	1	4
C07FB, beetasalpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	5	0	5	4

22. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- 1 Kun lääkemääräyksen voimassaoloaika on pidennetty kahteen vuoteen, voidaan kysyä, onko hoitajan lääkkeenmääräysoikeudella (uusimisoikeus) näissä sairauksissa merkitystä? Olisiko pikemminkin varmistettava se, että sydän- ja verisuonitauteja sairastavalla potilaalla olisi mahdollisuus päästä hoitavan lääkärin arvioon vähintään kahden vuoden välein?

23. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeisiin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
C07AA, epäselektiiviset beetasalpaajat; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	0	0	0	1	0	1	4
C07AB, selektiiviset beetasalpaajat; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	0	0	0	1	0	1	4
C07AG, alfa- ja beetareseptoreita salpaavat lääkeaineet; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	0	0	0	1	0	1	4
C07B, beetasalpaajat ja tiatsidit; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	0	0	0	1	0	1	4
C07FB, beetasalpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat; primaarinen verenpainetauti, sepelvaltimotauti	0	0	0	1	0	1	4
B01AA03, varfariini; krooninen eteisvärinä, pysyvä antikoagulaatiohoito	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	6	0	6	4

24. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- 1 Kun lääkemääräyksen voimassaoloaika on pidennetty kahteen vuoteen, voidaan kysyä, onko hoitajan lääkkeenmääräysoikeudella (uusimisoikeus) näissä sairauksissa merkitystä? Olisiko pikemminkin varmistettava se, että sydän- ja verisuonitauteja sairastavalla potilaalla olisi mahdollisuus päästä hoitavan lääkärin arvioon vähintään kahden vuoden välein?

Asia korostuu etenkin sepelvaltimotaudin kohdalla. Antikoagulanttihoitoa on myös ehdottomasti syytä aika ajoin arvioida potilaan muuhun tilanteeseen, sairauksiin ja

25. Arvioi ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 diabeteslääkkeitä tyyppiin 2 diabeteksen hoitoon. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
A10BH, dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4) -estäjät	0	0	0	1	0	1	4
A10BD02, metformiini ja sulfonyyliureat	0	0	0	1	0	1	4
A10BD07, metformiini ja sitagliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD08, metformiini ja vildagliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD10, metformiini ja saksagliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD11, metformiini ja linagliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD13, metformiini ja alogliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD18, metformiini ja gemigliptiini	0	0	0	1	0	1	4
A10BD22, metformiini ja evogliptiini	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	9	0	9	4

26. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

1 Lähtökohtaisesti diabeteslääkityksen uusiminen kuuluu lääkrille osana diabeetikon hoitosuunnitelman arviota. Kyseessä on moniulotteinen sairaus, ja diabeetikoilla on usein muita sairauksia, jotka tulee ottaa huomioon hoitoa määrittäessä.

Mikäli esityksen mukaisiin muutoksiin mennään, on huomioitava, että hoitosuunnitelmien rajausten tulee olla yksiselitteisiä, eikä sairaanhoitaja voi tehdä esimerkiksi muutoksia lääkeryhmien sisällä, ellei tätä ole erikseen määrätty.

27. Arvioi ehdotusta laajentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviä ATC-luokkia R03BA ja R03AC sekä lisätä liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeitä. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Glukokortikoidien ikäraja on 15-vuotta.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R03BA, glukokortikoidit	0	0	0	1	0	1	4
R03AC, selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit	0	0	0	1	0	1	4
R03AK06, salmeteroli ja flutikasoni	0	0	0	1	0	1	4
R03AK07, formoteroli ja budesonide	0	0	0	1	0	1	4
R03AK08, formoteroli ja beklometasoni	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	5	0	5	4

28. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

29. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeisiin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R03AC, selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit; astma, COPD	0	0	0	1	0	1	4
R03AK06, salmeteroli ja flutikasoni; astma, COPD	0	0	0	1	0	1	4
R03AK07, formoteroli ja budesonide; astma, COPD	0	0	0	1	0	1	4
R03AK08, formoteroli ja beklometasoni; astma, COPD	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	4	0	4	4

30. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Keuhkohtaumatautia sairastavat ovat tyypillisesti iäkkäitä ja monisairaita potilaita, joiden kohdalla on ehdottomasti syytä arvioida kokonaistilannetta säännöllisesti lääkärin vastaanotolla.

31. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan allergiseen nuhaan ja adrenaliinikynä anafylaktisen reaktion ensihoitoon. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Kortikosteroidien ikäraja on 15-vuotta.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
R06AE07, setiritsiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AE09, levosetiritsiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX13, loratadiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX18, akrivastiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX22, ebastiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX26, feksofenadiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX27, desloratadiini	0	0	0	1	0	1	4
R06AX29, bilastiini	0	0	0	1	0	1	4
R01AD, kortikosteroidit, sis. yhdistelmävalmisteet	0	0	0	1	0	1	4
C01CA24, arenaliini; anafylaktisen reaktion ensihoito	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	10	0	10	4

32. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Antihistamiinit voisi vapauttaa käsikauppaan myös suurempien pakkaukokojojen osalta. Hoitajareseptioikeudelle ei tältä osin ole tarvetta.

33. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä kipulääkkeitä lääkärin arvioimaan pitkäaikaiseen kipuun. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti.

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
M01AE01, ibuprofeeni (ei 800 mg)	0	0	0	1	0	1	4
M01AE02, naprokseeni	0	0	0	1	0	1	4
N02BE01, parasetamoli	0	0	0	1	0	1	4
Yhteensä	0	0	0	3	0	3	4

34. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Krooninen kipu vaatii säännöllistä ja asianmukaista lääkärin arviointia. Tulehduskipulääkkeiden sijaan ensisijaisesti olisi syytä suosia parasetamolia.

35. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
G03A, systemisesti käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, 15-34-vuotiaalle naiselle; pois lukien ATC-luokan G03AD valmisteet jälkiehkäisyyn	1	0	0	0	0	1	1
G02BA03, progesteronia sisältävä muovikierukka; 15-34-vuotiaalle naiselle	1	0	0	0	0	1	1
G02BB01, progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät emätinrenkaat; 15-34-vuotiaalle	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	3	0	0	0	0	3	1

36. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Ikärajoitus on järkevä.

37. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 2 optikon vastaanottoaan varten hankittavissa oleva lääke.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
S01JA51, fluoreseiini, yhdistelmävalmiste; silmän etupinnan puudutus, sarveiskalvon värjäys	1	0	0	0	0	1	1

38. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

39. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 3 suuhygienistin vastaanottoaan varten hankittavissa olevia lääkkeitä ja desinfektioaine.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
C01CA24, adrenaliini; anafylaktisen reaktion ensihoito	1	0	0	0	0	1	1
N01BB02, lidokaiini, yhdistelmävalmiste; infiltraatiopuudutus subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti	1	0	0	0	0	1	1
N01BB58, artikaiini, yhdistelmävalmiste; infiltraatiopuudutus subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti	1	0	0	0	0	1	1
Lievästi denaturoitu etanoli; pintojen desinfektio	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	4	0	0	0	0	4	1

40. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Ei vastauksia.

41. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muutosehdotuksiksi?

Vastaajien määrä: 1

- 1 Esitykseen liittyvä taloudellisten vaikutusten arviointi vaikuttaa liian optimistiselta. Lisäkoulutukseen liittyy merkittävä taloudellinen investointi. Työn vaativuuteen liittyen palkkakustannuksissa tapahtuu nousua. Yksikkökustannusten osalta on myös huomioitava, että käytännössä työhön kulunut aika on hoitajilla ollut pidempi kuin lääkäreillä.

Perusterveydenhuollon lääkäriresurssin vahvistamisella olisi saatavissa samat tavoitteet kuin tällä säädösuudistuksella. Samalla säilytettäisiin asiantuntijaorganisaation parempi ketteryys toimintaympäristön tulevia muutoksia ajatellen.

42. Arvioikaa ehdotusta koulutusasetuksen 4 §:n, 6 §:n ja 7 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Vastaajien määrä: 1

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa	Yhteensä	Keskiarvo
4 § Koulutuksen sisältö:Opiskelija saa lääkkeenmääräämiskoulutusta suorittaessaan korkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata lääkkeenmääräämiskoulutukseen kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.	1	0	0	0	0	1	1
6 § Kelpoisuus koulutukseen:Koulutukseen otettavalla tulee olla							

vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus sillä tehtäväalueella, jolla hän tulee lääketta määräämään.	1	0	0	0	0	1	1
7 § Todistus: Korkeakoulu antaa opiskelijalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta. Todistukseen merkitään koulutuksen laajuus, osaamiskokonaisuudet ja niiden näyttö, tieto koulutukseen sisältyvää käytännön opiskelua ohjanneesta lääkäristä, tieto 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuista hyväksiluetuista ja korvatuista opinnoista sekä tieto siitä, että kyseessä on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 14 §:n 3 momentissa tarkoitettu rajatun lääkkeen määräämisen erikoispätevyden edellyttämä koulutus.	1	0	0	0	0	1	1
Yhteensä	3	0	0	0	0	3	1

43. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Vastaajien määrä: 1

- Olennaista on varmistaa, että tosiasiallinen koulutus on riittävä, kattava, ajantasaista ja kaikin puolin asianmukaista.

44. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muutosehdotuksiksi?

Ei vastauksia.